

Egycusate Plus



Docusate sodium 50 mg / Sennosides 8.6 mg

Film coated tablets

1-Company name :

Egyptian group for pharmaceutical industries

2-Trade name : Egycusate Plus

F.C.T

3-Generic name:

Each Film Coated Tablet Contains:

Docusate Sodium	50 mg
Sennosides	8.6mg

4-Composition:

Each Film Coated Tablet Contains:

Active Ingredients:

Docusate Sodium	50mg
Sennosides	8.6mg

Inactive Ingredients:

Microcrystalline Cellulose, Croscarmellose Sodium, Colloidal Silicon Dioxide, Dibasic Calcium Phosphate Anhydrous, Magnesium Stearate, Hypromellose, Polyethylene Glycol, Titanium Dioxide, D&C Yellow#10, Iron Oxide Yellow, Talc, Carnuba Wax

5-Pharmaceutical form:

Film Coated Tablet

6-Pharmacological action:

Docusate is a stool softener product.
Senna stimulates the colon.

This coordinated dual action of the two ingredients results in colon-specific, predictable laxative effect, generally producing bowel movement in 6 to 12 hours.

7-Pharmacokinetics:

Docusate is absorbed from the gastrointestinal tract and excreted in bile. There is some absorption of senna after oral administration.

Absorbed senna are metabolised in the liver. Unabsorbed senna is hydrolysed in the colon by bacteria to release the active free anthraquinones. Anthraquinones are excreted in urine and faeces.

8-Indication: Relieves occasional constipation (irregularity). Generally produces bowel movement in 6 to 12 hours. Also are suitable for relief of postsurgical and postpartum constipation, and effectively relieve drug-induced constipation.

9-Dosage & Administration:

Recommended Dosage (or as directed by a doctor):

Take preferably at bedtime.

AGE	STARTING	MAXIMUM
Adults and children 12 years of age or older	2 tablets once a day	4 tablets twice a day
6 to under 12 years	1 tablet once a day	2 tablets twice a day
2 to under 6 years	1/2 tablet once a day	1 tablet twice a day
Under 2 years	Ask a doctor	

10-Contra – Indication:

Do not use this product if you are on a sodium-restricted diet unless told to do so by a doctor.

11-Side Effects:

May cause mild abdominal discomfort such as colic or cramps. Prolonged use or over dosage can result in diarrhea.

12-Drug Interactions:

It has also been suggested that concomitant administration of docusates and aspirin increases the incidence of adverse effects on the gastrointestinal mucosa. Docusates may enhance the gastrointestinal uptake of other drugs, such as liquid paraffin (which should not be given concomitantly).

13-Pregnancy & lactation:

Ask a health professional before use. Docusate salts & Senna are excreted into breast milk.

14-Precautions & warning:

Stop use and ask a doctor if you have rectal bleeding or fail to have a bowel movement after use of a laxative.

Do not use laxative products for longer than 1 week unless directed by a doctor.

Ask a doctor before use if you have stomach pain, nausea, vomiting, or noticed a sudden change in bowel habits that continues over a period of 2 weeks.

15-Package & storage:

Store at a temperature not exceeding 30°C. in a dry place

Carton Box contains one or two (Al//PVC) strip each strip contains 10 film coated tablets.

16-Package & storage:

- Do not use laxative for longer than 1 week unless directed by a doctor.
- Stop use if you have rectal bleeding or fail to have a bowel movement.
- For less than 2 years old ask a doctor.
- Keep out of reach of children.

17- Manufactured By:

Egyptian group for pharmaceutical industries-Egypt

ملين

أيجيكيوسات بلس

دوكيوسات صوديوم ٥٠ مجم/سينوسايد ٨,٦ مجم

اقراص مغلفة

موقع الاستخدام:

لا تستخدم هذا المنتج في حالة التقييد بنظام غذائي خالي من الصوديوم.

الأثار الجانبية:

قد تسبب مغص أو نقلصات بالمعدة ولكنها خفيفة. الإستخدام لفترة طويلة أو في حالة تجاوز الجرعة يمكن أن يؤدي إلى الإسهال.

التدخلات الدوائية:

الدوكيوسات والأسيبرين يزيد من حدوث آثار سلبية على الأغشية المخاطية المعدية المغوية. الدوكويوسات قد تزيد من امتصاص العقاقير الأخرى ، مثل السائل البرافين (التي لا ينبغي أن تعطى متلازمة).

الحمل والإرضاع:

إشتشر الطبيب المختص . علماً بأن الدوكويوسات والسيننا تفرز في لبن الأم.

التحذيرات والإحتياطات :

أوقف الإستخدام وإسأل الطبيب إذا كان لديك نزيف مستقيم أو إخفاق في حركة الأمعاء بعد إستخدام المسهل.

لا تستخدم المسهل لأكثر من أسبوع بغير إستشارة الطبيب.

إذا كان لديك : ألم المعدة ، والغثيان ، والتقيؤ ،لاحظت حدوث تغيير مفاجئ في عادات الأمعاء أكثر من أسبوعين.

العبوة وظروف التخزين :

علبة كارتون تحتوى علي شريط أو شريطين (ألو/ بي في سى) بكل شريط ١٠ اقراص مغلفة .

ويحفظ في درجة حرارة أقل من ٣٠ درجة مئوية في مكان جاف .

إرشادات المرضى:

لا تستخدم المسهل لأكثر من أسبوع بغير إستشارة الطبيب.

أوقف الإستخدام إذا كان لديك نزيف مستقيم أو إخفاق في حركة الأمعاء بعد إستخدام المسهل.

لأقل من عمر ستين استشر الطبيب. يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

إنتاج:

المجموعة المصرية للصناعات الدوائية- مصر

اسم الشركة:

المجموعة المصرية للصناعات الدوائية.

اسم المنتج:

أيجيكيوسات بلس.

المادة الفعالة:

دوكيوسات صوديوم

سينوسايد

المكونات:

كل قرص مغلف يحتوى على:

المواد الفعالة:

٥٠ مجم دوكويوسات صوديوم.

٨,٦ مجم سينوسايد

مايكروكريستالين سيليلوز ، كروسكارميولز

صوديوم ، كولييدل سيليكون دايوكسايد ، داي

بيزك كالسيوم فوسفات أنهيدرس ، ستارات

الماغنيزيوم ، هيروميلوز ، بولي إيثيلين

جلوكول ، تايتنيوم دايوكسايد ، دى و سى أصفر

، أوكسيد حديد أصفر ، تلك ، كارنوبا وكس.

الخواص:

دوكيوسات ملين.

السيننا يحفز القولون.

الحركة الدوائية:

أملأ الدوكويوسات تمتص من الجهاز الهضمي

و تفرز في العصارة الصفراوية

السيننا تفرز في البول و البراز.

دوعي الاستعمال:

يستعمل في حالات الإمساك عموماً تنتج حركة

الأمعاء في ٦ إلى ١٢ ساعة.

يستعمل أيضاً في حالات الإمساك مابعد

العمليات الجراحية وبعد الولادة ، أيضاً

للتحفيض من الإمساك الناتج من بعض الأدوية.

الجرعة والإستخدام:

يفضل أخذ الجرعة قبل النوم.

السن	الجرعة المبدئية	الجرعة القصوى
للبالغين و سن ١٢ سنة	٢ فرنس مرتين يومياً	٤ أقراص مرتين يومياً
من سن ٦ سنوات إلى أقل من ١٢ سنة	٢ فرنس مرتين يومياً	٢ فرنس مرتين يومياً
من سن ٦ سنوات إلى أقل من ٦ سنوات	٠,٥ فرنس مرتين يومياً	٠,٥ فرنس مرتين يومياً
أقل من ستين	أستشر الطبيب	

