

Egycusate Syrup

Docusate sodium 20 mg/5 ml



Composition:

In each 5 ml Syrup

Active Ingredient:

Docusate sodium 20 mg.

Inactive Ingredients:

Citric acid, Sodium citrate, Propylene Glycol, Poloxamer407, Poloxamer188, Polyethylene glycol 300, Polyethylene glycol 400, Methyl Paraben, Propyl Paraben, Sucrose, Cherry Flavor, Purified water.

Purpose:

Stool Softener

Uses:

For gentle, reliable relief from occasional constipation (irregularity). Generally produces bowel movement in 12 to 72 hours.

Warnings:

Do not use:

- Laxative products for longer than 1 week unless told to do so by a doctor.
- If you are presently taking mineral oil unless told to do so by a doctor.

Ask a doctor before use if you have:

- Stomach pain
 - Nausea
 - Vomiting
 - Noticed a sudden change in bowel habits that last over two weeks
- Stop use and ask a doctor if you have rectal bleeding or fail to have a bowel movement after use of a laxative. These could be signs of a serious condition. If pregnant or breast-feeding, ask a health professional before use. Keep out of reach of children. In case of overdose, get medical help or contact a Poison Control Center right away.

Directions:

- Take as directed by a doctor.
- Doses must be given in a glass of milk or fruit juice, to prevent throat irritation.
- Take only by mouth. Dose may be taken as a single daily dose or in divided doses.
- Dosage should be adjusted to individual response.

Adults and children 12 years of age and older	1 to 6 tablespoonfuls, or as directed by a doctor
Children 6 to under 12 years of age	1 to 2 ½ tablespoonfuls daily, or as directed by a doctor
Children under 6 years	Ask a doctor.

Package & Storage:

- Store at temperature not exceeding 30° C.
- Carton box Containing Plastic (Polyethylene terephthalate) Bottle of 100 ml with insert leaflet.

Manufactured By:

Egyptian Group for Pharmaceutical Industries (EGPI)





إيجيكيوسات شراب

دوكيوسات صوديوم ٢٠ مجم/٥ مللى

المكونات:

المواد الفعالة:

كل ٥ مللى تحتوى على: ٢٠ مجم دوكيوسات صوديوم.

المواد الغير فعالة:

حامض الستريك، سترات الصوديوم، بروبايلين جلايكول، بولوكسمر ٤٠٧، بولوكسمر ١٨٨، بولي إيثايلين جلايكول ٣٠٠، بولي إيثايلين جلايكول ٤٠٠، ميثايل بارابين، بروبايل بارابين، سكروز، نكهة كريز و ماء.

الغرض:

دوكيوسات يساعد على تخفيف البراز الجاف.

دواعى الإستعمال:

يستعمل في حالات الإمساك عموماً. تنتج حركة الامعاء فى ١٢ الى ٧٢ ساعة.

الإحتياطات و التحذيرات:

لا تستخدم:

- الملينات لمدة أكثر من أسبوع ما لم يقرر غير ذلك الطبيب.

- إذا كنت تتناول حالياً الزيوت المعدنية ما لم يقرر غير ذلك الطبيب.

اسأل الطبيب قبل الاستخدام اذا كان لديك:

- ألم بالمعدة

- الغثيان

- القيء

- لاحظت حدوث تغيير مفاجئ فى عادات الأمعاء أكثر من إسبوعين.

اوقف العلاج و أستشر الطبيب اذا كان لديك نزيف مستقيمي أو إخفاق فى حركة الأمعاء

بعد إستخدام الملين. قد تكون علامات علي وجود حالة خطيرة.

الحمل و الإرضاع:

إستشر الطبيب قبل الإستخدام.

يحفظ بعيداً عن الأطفال .

فى حالة زيادة الجرعة التوجه إلى أقرب مركز سموم.

الجرعة و الإستخدام:

- تؤخذ الجرعة حسب وصف الطبيب.

- يمكن أخذ كوب من الحليب أو عصير الفواكه لمنع تهيج الحلق.

- يؤخذ فقط عن طريق الفم. الجرعة يمكن أن تؤخذ كجرعة يومية واحدة أو مقسمة على

جرعات.

- الجرعة يجب أن تعدل حسب الاستجابة الفردية

من سن ١٢ سنة و أكثر	من ١ إلى ٦ ملاعق كبيرة (١٥ ملم) يومياً
من ٦ سنوات إلى أقل من ١٢ سنة	من ١ إلى ١/٢ ٢ ملعقة كبيرة يومياً
أقل من ٦ سنوات	إستشر الطبيب المعالج

العبوة وظروف التخزين:

- يحفظ في درجة حرارة لا تتعدى ٣٠ درجة مئوية .

- عبوة كارتون تحتوى على زجاجة بلاستيكية ١٠٠ مللى مع نشرة مرفقة.

إنتاج: المجموعة المصرية للصناعات الدوائية-مصر (EGPI)