



## موانع الإستعمال:

- قصور القلب الحاد.
- حصار القلب من الدرجة الثانية و الثالثة.
- النبض البطيء.
- حصار جيبى أذينى.
- قصور عضلة القلب الغير معالج.
- الصدمة القلبية.
- إنخفاض ضغط الدم.
- حماض إستقلابى.
- الأمراض الشريانية الطرفية الشديدة.
- ورم القواتم.
- ذباح برنزميتال.

- ربو.

## الأثار الجانبية:

خصوصا فى بداية العلاج قد يحدث صداع خفيف ، دوخة ، شعور بالإجهاد وعادة ما تكون هذه الأعراض معتدلة وتزول بعد ٢-١ اسابيع من بداية العلاج. إسهال ، إمساك ، غثيان ، ألم بطنى. أحيانا إنخفاض ملحوظ فى ضغط الدم ومعدل النبض ، توخز و برودة فى الأطراف. فى حالات نادرة حكة ، و قلة الدموع الخلل الوظيفى الجنسى و الصداق .

**التداخلات الدوائية:** ريسيرباين ، الفا ميثيل دوبا، كلونيدين، نيفيديبين، مضادات الالتهابات، مثبطات مونو أمين أوكسيديز و ريفمبين.

قبل أى عملية جراحية يجب أن يكون أخصائى التخدير على علم بإستعمال بيسوبرولول.

## الحمل و الإرضاع:

- يخفض الدم فى المشيمة.
- لا يستخدم أثناء الرضاعة الطبيعية.

## الإحتياطات و التحذير:

لا ينبغى إيقاف إيجيبرو دون توجيهات الطبيب. يجب ألا يوقف العلاج فجأة ولكن لا بد من وقفة على أساس تدريجى. يستعمل بحذر مع مرضى حصار القلب ، السكرى ، ارتفاع الضغط البابى ، إنسداد المسلك الهوائى ، الوهن العضلى الوبيلى و فرط الحساسية.

## العبوات و التخزين:

إيجيبرو ٥ مجم: علبة كرتون تحتوى على ١٠ أقراص فى شريط واحد (PVC/AL) ونشرة مرفقة.

إيجيبرو ٥ مجم: علبة كرتون تحتوى على ٢٠ قرص فى شريطين (PVC/AL) ونشرة مرفقة.

إيجيبرو ٥ مجم: علبة كرتون تحتوى على ٣٠ قرص فى ثلاثة شرائط (PVC/AL) ونشرة مرفقة.

إيجيبرو ١٠ مجم: علبة كرتون تحتوى على ١٠ أقراص فى شريط واحد (PVC/AL) ونشرة مرفقة.

إيجيبرو ١٠ مجم: علبة كرتون تحتوى على ٢٠ قرص فى شريطين (PVC/AL) ونشرة مرفقة.

يحفظ فى درجة حرارة لا تتعدى ٣٠ درجة مئوية فى مكان جاف.

## إنتاج:

شركة المجموعة المصرية للصناعات الدوائية. مصر



**إسم الشركة:**  
المجموعة المصرية للصناعات الدوائية.

## إسم المنتج:

إيجيبرو ٥ مجم

إيجيبرو ١٠ مجم

## بيان التركيب:

يحتوى كل قرص من إيجيبرو ٥ مجم على: ٥ مجم بيسوبرولول فيوماريت.

يحتوي كل قرص من إيجيبرو ١٠مجم على: ١٠ مجم بيسوبرولول فيوماريت.

**الأثر الدوائى:** إيجيبرو قافل لمستقبلات البيتا فى القلب. البيسوبرولول يخفض من النتاج القلبى. أيضاً التخفيف من أثار الجهاز العصبى السمبثاوى من حيث التوصيل داخل القلب.

يساعد فى حالات قصور القلب عن طريق إيقاف النشاط السمبثاوى.

## الحركية الدوائية:

بيسوبرولول فيوماريت يمتص كاملاً من الجهاز الهضمى. يصل الى ذروة التركيز فى البلازما خلال ٢ إلى ٤ ساعات. العمر النصف زمنى للإخراج من ١٠ إلى ١٢ ساعة.

الأبيض عن طريق الكبد و الإفراغ عن طريق البول.

## دواعى الإستعمال:

يستخدم إيجيبرو فى الحالات الآتية:

- ارتفاع ضغط الدم.
- قصور الشريان التاجى و الذبحة الصدرية.
- قصور القلب المزمن المستقر.

## الجرعة:

يبدأ العلاج بجرعات منخفضة ثم تزداد تدريجياً. فى كل الحالات يجب أن يكون ضبط الجرعات مناسباً لكل حالة على حدة.

• حالات ضغط الدم المرتفع او حالات قصور الشريان التاجى او الذبحة الصدرية:

قرص واحد من إيجيبرو ٥ مجم يومياً . إذا كانت الجرعة غير كافية، تزداد الجرعة إلى قرص واحد من إيجيبرو ١٠ مجم يومياً . يمكن زيادة الجرعة فى الحالات الإستثنائية فقط.

• حالات قصور القلب المزمن المستقر:

يبدأ العلاج بجرعة ٥,٢٥ مجم يومياً لمدة إسبوع على أن تزداد إلى ٢,٥ مجم يومياً لمدة أسبوع ثم ٣,٧٥مجم يومياً لمدة أسبوع ثم إلى ٥ مجم يومياً لمدة ٤ أسابيع ثم إلى ١٠مجم كجرعة دائمة.

## كيفية الإستعمال:

يتم بلع القرص مع بعض السوائل .

يمكن أن تؤخذ الجرعة مع أو بدون الطعام.

يفضل أخذ الجرعة فى الصباح.