

# Propamethone

Cream



0.05 % Betamethasone, 1% Clotrimazole, 0.1% Gentamycin

**1- Company name:** Egyptian Group for Pharmaceutical Industries(EGPI)

**2- Trade name:** Propamethone Cream

**3- Generic name:** Each gram of Propamethone contains:

0.64 mg Betamethasone dipropionate equivalent to 0.5mg of Betamethasone, 10 mg Clotrimazole ,Gentamicin sulfate equivalent to 1 mg of gentamicin base.

**4- Composition:**Each gram of Propamethone contains:

**Active Ingredient:** 0.64 mg Betamethasone dipropionate equivalent to 0.5mg of Betamethasone, 10 mg Clotrimazole,Gentamicin sulfate equivalent to 1 mg of gentamicin base.

**Inactive Ingredient:** Heavy mineral oil, white soft paraffin, cetostearyl alcohol, cetomacrogol1000, benzyl alcohol, sodium acid phosphate, phosphoric acid, Propylene glycol, purified water.

**5- Pharmaceutical form:** Cream

**6- Pharmacological action:** Propamethone is a combination of betamethasone dipropionate which exhibits anti-inflammatory, antipruritic and vasoconstrictive properties, clotrimazole with its broad spectrum antifungal activity and Gentamicin sulfate which is a broad spectrum antibiotic.

**7- Pharmacokinetics:** No study for penetration & resorption has not been made for human being for this product.

**8- Indication:**

- Propamethone is indicated for the relief of the inflammatory and pruritic manifestations of corticosteroids responsive dermatoses when complicated by secondary infection or when the possibility of such infection is suspected.

- Clotrimazole is effective in the treatment of:

Tinea pedis, tinea cruris and tinea corporis caused by Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes, Epidermophyton floccosum and Microsporum canis.  
Candidiasis caused by Candida albicans.

Tinea versicolor caused by Malassezia furfur.

-Gentamicin is sensitive to Streptococci (group A beta hemolytic, alpha hemolytic), Staphylococcus aureus( coagulase positive, coagulase negative and some pecticillinase-producing strains) and the gram-negative bacteria, Aerobacter aerogenes, Escherichia coli, Proteus vulgaris , Klebsiella pneumoniae and Pseudomonas aeruginosa.

**9- Dosage & Administration:** Thin film of Propamethone cream should be applied to cover completely the affected and surrounding skin areas twice daily.

**10-Contraindications:** Hypersensitivity to any of the components of the product.

**11-Adverse effects:** Adverse reactions reported very rarely with Propamethone include erythema, pruritus, burning, exudation, hypochromia, irritation, folliculitis, hypertrichosis and skin atrophy.

**12-Drug Interaction:** When dealing with Propamethone in the genital or anal region and the simultaneous use of latex preservatives, white petrolatum and paraffin viscous can lead to a reduction of the resistance to tearing of preservatives and therefore a decline in security.

Clotrimazole antagonist with amphotericine.

**13- Pregnancy & Lactation:**

Not recommended during pregnancy.

Not recommended to be used on breast during lactation.

**14- Precautions & Warning:**

• If irritation or sensitization develops with the use of Propamethone product, treatment should be discontinued.

• Application of Gentamicin to open wounds or damaged skin should be avoided.

• Safety use of Propamethone product in pregnant women has not been established.

Caution should be exercised when Propamethone is applied to a nursing mother.

• Propamethone is not for ophthalmic use.

**15-Package:**Propamethone cream is available in an aluminum tube 20 gm and an inner insert.

**16- Storage:**Storage temperature not exceeding 30°C.

Keep away from reach of children.

**17- Instructions to patients:**

- For External use only.

- Not for ophthalmic uses.

- Not recommended during pregnancy & lactation.

- Application to open wounds or damaged skin should be avoided.

- If irritation or sensitization develops with the use of Propamethone product, treatment should be discontinued.

Manufactured by:  
*Egyptian Group for Pharmaceutical Industries.*



# بروباميثون كريم

٥٠٪ بيتاميثازون، ١٪ كلوتريمازول، ١٪ جيتناميسين.



المجموعة المصرية للصناعات الدوائية (EGPI).

بروباميثون كريم

اسم الشركة:

اسم المنتج :

الإسم العلمي:

كل جرام من بروباميثون يحتوى على:

٤٠ مجم بيتاميثازون دايروبيبونات يكافىء ٥٠ مجم من بيتاميثازون، ١٠ مجم كلوتريمازول،

جيتناميسين سالفات يكافىء ١ مجم من جيتناميسين.

بيان التركيب:

كل جرام من بروباميثون يحتوى على:

المواد الفعالة: ٦٤ مجم بيتاميثازون دايروبيبونات يكافىء ٥٠ مجم من بيتاميثازون، ١٠ مجم كلوتريمازول، جيتناميسين سالفات يكافىء ١ مجم من جيتناميسين.

المواد الغير فعالة: زيوت معدنية، بارافين ابيض، سيلوتستياريل كحول، بولي ايثلين جلايكول، كحول بنزيلي، صوديوم حمض فوسفات، حمض فوسفورك، بروبيلين جلايكول، ماء.

الأثر الدوائي: بروباميثون هو مزيج من بيتاميثازون دايروبيبونات الذي له خصائص مضادة للالتهاب وللحكة وقابضة للأوعية الدموية، الكلوتريمازول الذي يعتبر مضاد للفطريات واسع

المجال وجيتناميسين سالفات الذي يعتبر مضاد للبكتيريا واسع المجال.

الحركة الدوائية: لم تجري دراسات.

دوعي الاستعمال:

- بروباميثون يستخدم لعدة اغراض ظواهر الالتهابات والحكمة لأمراض الجلد المستجيبة لستيرويدات القشرية عند إلتهابها أو احتمال إصابتها بالتهاب.

- الكلوتريمازول فعال في علاج تينيا القدم، تينيا المراغف، تينيا الجسد والتينيا المبرقة بالإضافة إلى داء المبيضات.

- جيتناميسين يمكن استخدامه لعلاج الإصابة بالبكتيريا العنقودية، البكتيريا العنقودية، البكتيريا سالبة الجرام، إروباكتير الهوائي، الإشريشيا القولونية، البروتوبيوس، الكلبسيللة الرئوية والزانفة الزنجارية. الجرعة و كيفية الاستعمال: توضع طبقة رقيقة من بروباميثون كريم على منطقة الجلد المصابة و حولها مرتين يوميا.

موقع الاستعمال: المرضى الذين لديهم حساسية لإى من مكونات المستحضر. التأثيرات الجانبية: نادرًا ما سجلت تأثيرات جانبية موضعية مع بروباميثون وتتضمن: تشوش الحس، الحكة، حرقان، توخر، تهيج، طفح، نقص الصباغ، فرت الإشعار وعلامات ضمور الجلد.

التدخلات الدوائية: الكلوتريمازول يضاد الإيمورترين.

الحمل والإرضاع: لا يستخدم أثناء الحمل والرضاعة.

التحذيرات والاحتياطات:

• في حالة حدوث تهيج أو تحسس عند استخدام بروباميثون يجب إيقاف استخدامه.

• يجب تجنب استخدام جيتناميسين في الجروح المفتوحة.

• سلامة استخدام مستحضرات بروباميثون في السيدات الحوامل لم تثبت بعد.

• يجب توخي الحذر أثناء استخدام بروباميثون أثناء الإرضا.

• مستحضرات بروباميثون غير مخصصة للاستخدام في العين.

العبوات المتوفرة والتخزين :

بروباميثون كريم أنبوبة الومينيوم تحتوى على ٢٠ جرام ونشرة داخلية.

يحفظ في درجة حرارة لا تتعدي ٣٠ م.

تحفظ جميع الأدوية بعيدا عنتناول الأطفال.

إرشادات للمرضى:

للإستعمال الخارجي فقط.

لا يستخدم للعين.

لا يستخدم أثناء الحمل والرضاعة.

في حالة حدوث تهيج أو تحسس عند استخدام بروباميثون يجب إيقاف استخدامه.

يجب تجنب استخدامه في الجروح المفتوحة.

إنتاج:

المجموعة المصرية للصناعات الدوائية.